#### VARIANTES STRUCTURALES

- 1. petits indels
- 2. copy number variation
- 3. réarrangements

Variantes structurales \* IFT6299 H2014 \* UdeM \* Miklós Csűrös

## **Petits indels**

petits indels (1..10 ou ..20 pb) — variantes génomiques 1/8 aussi fréquentes que les SNPs (mais presque même longueur combinée entre SNP et indels)

Table 1. Summary of small INDELs identified from 98 million

| re-sequencing traces                                      |                |
|---|----------------|
| Traces screened   | 98,350,511     |
| Bases analyzed (trimmed)<br>Reference human genome (hg18) | 42,000,606,219 |
| Cumulative coverage                                       | 13.5×          |
| Variants identified                                       | 3,400,787      |
| Unique (nonredundant) variants                            | 1,955,656      |
| Insertions  | 978,721        |
| Deletions   | 976,935        |
| Total bases affected                                      | 11,909,159     |
|   |                |

- on infère les petits trous à partir des alignements des lectures
- il faut refaire l'alignement pour identifier la variante en commun



Mills & al Genome Research 21:830 (2011); Neuman, Isakov & Shomron Briefings in Bioinformatics 14:46 (2012)

#### DINDEL

travailler avec des candidats de haplotypes + alignement statistique entre haplotype et lectures

haplotypes : combiner les lectures en blocs de haplotypes considérer toute combinaison de blocs fréquents + variantes proposées à l'entrée



 $(\leq 8 \text{ haplotypes à la fois})$ 

Albers & al Genome Research 21 :961 (2011)

### **DINDEL** : alignement

haplotype définit un modèle probabiliste — alignment par Viterbi variables observées :  $R^b$ ,  $b = 1, ..., \ell$  bases dans la lecture variables inconnues :  $X^b$  position de base b,  $I^b$  indicateur pour insertion de base bancrer au milieu de la lecture alignée ( $b_0$ ) transitions considèrent homopolymer runs



Albers & al Genome Research 21:961 (2011)

#### Détection et couverture



PPV=positive predictive value

sensitivity = 
$$\frac{TP}{TP + FN}$$
 PPV =  $\frac{TP}{TP + FP}$ 

Neuman, Isakov & Shomron Briefings in Bioinformatics 14:46 (2012)

## Meilleures pratiques

| Tool name        | Advantages  | Limitations   |
|------------------|---|---|
| GATK             | Highly supported with good overall performance                                | Low sensitivity at very low coverage (<10×; can be improved by less stringent parameters) |
| Dindel           | Best performance at low coverage  | Only suitable for Illumina data analysis and has long running time                        |
| SAMtools mpileup | High PPV and simple use   | Lowest sensitivity at high coverage ( $>50\times$ )                                       |
| VarScan          | High sensitivity at intermediate/high coverage (>30 $\times$ ) and simple use | Low PPV at default parameter settings and low sensitivity at low coverage (<30×)          |



**Figure 5:** Venn diagram depicting the number of indels found for each software with  $30 \times$  and  $150 \times$  coverage and read length 72. Inclusion of indels called in any of the software results in a decrease in PPV with only a mild sensitivity improvement. Inclusion of indels supported by at least two software results in a sensitivity improvement for some of the software and a significant increase in PPV, crucial in high coverage data.

Neuman, Isakov & Shomron Briefings in Bioinformatics 14:46 (2012)

### Variation structurale

classes principales : suppression, insertion, duplication, inversion/translocation



Alkan, Coe & Eichler Nature Reviews Genetics 12:363 (2011)

# Signatures de SV



Alkan, Coe & Eichler Nature Reviews Genetics 12:363 (2011)

#### Breakdancer

détection de SV à partir des paires discordantes :

- 1. paire discordante : orientation incompatible et/ou distance surprenante
- 2. régions avec trop de paires discordantes
- 3. liaisons : régions liées par  $\geq 2$  paires discordantes



Figure 1 | Overview of BreakDancer algorithm. (a) The workflow.
(b) Anomalous read pairs recognized by BreakDancerMax. A pair of arrows represents the location and the orientation of a read pair. A dotted line represents a chromosome in the analyzed genome. A solid line represents a chromosome in the reference genome.

Chen & al. Nature Methods 6 :677 (2009)

# Duplications

duplications : vérifier paires et couverture par lectures



1. mapping : identifier des lectures trop fréquentes et discordantes (mauvaise orientation ou distance >  $\mu$  +  $3\sigma$ )

Medvedev & al. Genome Research 20 :1613 (2010)

#### **CNVer**

2. groupage de paires discordantes, calculer positions (s, t) sur la référence pour la partie intérieure



Medvedev & al. Genome Research 20 :1613 (2010)

### CNVer (cont.)

3. "Donor graph" : représenter la référence par blocs uniques (compression de régions dupliquées), y ajouter les clusters de paires discordantes, arêtes bi-orientées



4. optimisation de flot dans le réseau (sans assemblage)

Medvedev & al. Genome Research 20 :1613 (2010)